

Depuis environ deux ans qu'on emploie intérieurement l'extrait de liège contre les maladies chirurgicales les plus graves et les plus rebelles, l'Académie est attentive sur le fruit que l'humanité peut retirer de ce remède. par conséquent on est toujours sûr d'être bien accueilli; lorsqu'on lui envoie des observations sur ce point de pratique. M^r Crecourt docteur en médecine, et chirurgien major de l'hôpital royal et militaire de roeroy, en a envoyé deux qu'elle m'a chargés d'examiner.

Le sujet de la première est un enfant de 10 ans dont la mâchoire inférieure étoit atteinte depuis trois ans de tumeurs scrophuleuses; il y avoit cinq glandes adhérentes, dont la plus petite étoit grosse comme un œuf. outre cela il y avoit trois ulcères dont les bords étoient douloureux et renversés, et le fond carcinomateux; la matière sanieuse qui en sortoit étoit si acre qu'elle corrodoit la peau qu'elle soulevoit; enfin l'enfant étoit pâle, et d'une maigreur tendante au marasme. après avoir tenté inutilement plusieurs sortes de remèdes, il y avoit plus de 6 mois qu'on les avoit abandonnés, et qu'on avoit jugé le mal incurable: M^r Crecourt vit alors le malade pour la première



sois; il conseilla l'usage de l'extrait de ciguë; on commença par un grain, et l'on augmenta chaque jour d'un grain jusqu'à 24, qui fut la dose à laquelle on se fixa; parce que, dit l'auteur, ce remède procureroit jusqu'à trois ou quatre selles par jour. Dès le 15^e on commença à s'apercevoir des bons effets de la ciguë, les douleurs se calmèrent, les bords des ~~ulcères~~ ulcères devinrent plus mols, et s'affaiblirent, les glandes se ramollirent, et la suppuration devint loïable. au bout d'un mois les ulcères se sont parfaitement cicatrises; enfin 3 onces $\frac{1}{2}$ gros d'extrait de ciguë, que l'enfant a pris en deux mois et demi, ont suffi pour fondre les principales glandes; ce qui restoit de la $\frac{1}{2}$ ~~est~~ ^{estoit} très peu de chose, un mois après qu'on avoit discontinué le remède; du reste, pendant le traitement, l'enfant est devenu plus fort et la couleur et l'embonpoint luy sont revenus.

Dans la seconde observation de M^r. Crecourt il s'agit d'une fille de 17 ans, dont les regles furent supprimées accidentellement: peu de temps après il luy survint à la matrice externe une tumeur

qu'elle porta pendant trois mois sans la faire voir à personne; cette tumeur étoit d'abord dure, et indolente; mais la suppuration s'étant déclarée, la matière se fit jour par plusieurs ouvertures, lesquelles bientôt ne formèrent plus qu'un ulcère hideux avec des bords violets, calleux et renversés; les chairs du fond étoient mollasses, d'une sensibilité extrême et toujours prêtes à saigner. outre cela la malade avoit le ventre tendu, douloureux, et sans d'obstruction, les cuisses et les jambes étoient enflées et œdémateuses, la respiration étoit fort gênée; la malade néanmoins étoit sans fièvre. M^r Freycourt la mit à l'usage de la lique; mais dans le temps que le mal faisoit des progrès sensibles vers la guérison par l'effet du remède, cette femme inspira à cette fille une répugnance invincible à le continuer; de sorte que depuis ce moment son état devint, par une dégradation rapide, plus fâcheux qu'il n'étoit auparavant.

Pour faire mieux sentir l'intérêt qu'on doit prendre à ces observations, j'en joindrai ici quelques unes, qui donnent des grandes espérances sur l'efficacité de l'extrait de lique dans les



maladies les plus graves. L'année passée je m'étois chargé de lire à la séance publique un mémoire pour rendre compte ^{à l'assemblée} ~~au public~~ des expériences que plusieurs membres de cette compagnie avoient faites sur les effets de ce remède; et la séance se trouvant remplie par la lecture d'autres mémoires plus intéressans, je ne lui point le mien. Dans ce mémoire je rapportois deux observations de M^r Coste chirurgien à meru en beauvoisin, avec lequel j'étois en relation. Dans la première il s'agissoit d'une fille de 16 ans, attequée depuis l'âge de 11 d'une affection herpétique d'une espèce très maligne; les signes qui caractérisoient cette maladie étoient dix ou douze ulcères plus ou moins grands au visage; le bout du nez étoit rongé jusqu'au cartilage; toute l'aile gauche et une partie de la droite étoient détruites; le canal nasal de chaque côté étoit obstrué au point que les larmes ne couloient plus par la cavité de l'un ni de l'autre; les yeux étoient éraillés; neuf ou dix glandes extrêmement dures regnoient autour du col, les aines et les aisselles en étoient aussi remplies; le foye étoit beaucoup plus gros que dans l'état naturel, l'haleine étoit fort

puante, et la mala étoit d'une maigreur extrême.

La personne qui faisoit le sujet de la seconde observation de M. Lorte étoit une fille âgée de 28 ans, qui avoit à la mamelle un ulcère cancéreux, qui rendoit une sanie gluante, un peu jaunâtre, et d'une odeur insupportable; la mamelle excédoit d'un tiers sa grosseur naturelle; elle étoit fort dure, et d'un rouge foncé tirant sur le violet; à sa partie moyenne latérale gauche s'élevoit une autre tumeur, dont la superficie étoit parsemée de vaisseaux variqueux, et dans laquelle la malade sentoit des battements très douloureux; enfin à la partie supérieure on observoit plusieurs autres glandes skirreuses, mais peu considérables. M. Lorte mit ces deux malades à l'usage de l'extrait de liqur suivant la méthode de M. More: le remède eut d'abord un succès aussi heureux que rapide dans les deux maladies; les symptômes disparoissent successivement, les glandes se fondent, les ulcères se cicatrisent; en un mot le mal touchoit presque au terme de sa guérison dans l'une et l'autre malade, lorsqu'il rétrograda tout d'un coup avec la même rapidité, et qu'il devint pire qu'il n'étoit auparavant, malgré que



L'usage du même remède fut continué avec toute l'exactitude possible.

Les succès imparfaits de l'extrait de cigue, et le peu de fruit que plusieurs membres de cette compagnie en avoient retiré, ne m'avoient inspiré qu'une confiance très médiocre en le remède; c'étoit la conclusion de mon mémoire; mais depuis j'ai eu lieu de revenir de ce préjugé. de même M^r. Coste me fit demander, au mois d'avril dernier, mon avis sur l'état de la petite fille, attaquée d'évoüelles, et qui fait le sujet de sa première observation: voyant que la cigue n'avoit point réussi, je conseillai des fondants de rotron: quelques raisons particulières empêchèrent qu'on tentât ce moyen sur la malade pour laquelle il avoit été proposé; mais M^r. Coste, toujours frappé des bons effets de la cigue dans les deux occasions, dont j'ai parlé, imagina que pour faciliter l'action de ce remède, il étoit d'une nécessité indispensable de purger souvent pendant son usage, et de trouver pour cet effet un purgatif convenable; les remèdes de rotron, qu'on lui avoit envoyés de paris, furent l'occasion qui lui fit préférer la pâte alexitére

De cet auteur: je rapporte cette circonstance parce que depuis la mort de M^r Coste, qui est arrivée, il y a environ un mois, le frere Joseph feignant a la vanité de dire dans le public que c'est luy même qui a conseillé à ce chirurgien de joindre le purgatif à l'usage de la liqueur, ce qui est contre la vérité.

Le premier essai que M^r Coste fit de cette nouvelle méthode, qu'il ne devoit qu'à ses lumières, fut sur la même personne qui avoit un cancer à la mamelle droite, et que la liqueur seule n'avoit pû guérir l'année précédente, comme j'en ai rapporté cy devant; il luy donna cette seconde fois la dose de ce remède un peu plus forte, et il la purgeoit tous les huit jours avec la pâte de robon: cette pratique a eu le succès le plus complet; dans l'espace d'un peu moins de quatre mois; c'est à dire depuis le milieu du mois de mai, jusqu'au commencement de j^{bre} suivant les glandes se sont fondues, les ulcères se sont cicatrisés, et j'ai été informé depuis peu de jours, que la guérison subsiste toujours solide et parfaite.

Pendant le traitement de cette malade, il se présenta à M^r Coste un homme âgé de 62 à 63 ans,



qui avoit depuis le mois de mars 1788 un cancer au visage, qui avoit fait des progrès extrêmement rapides; la face de cet homme n'avoit presque aucun trait de figure humaine; elle ne présentait qu'un ulcère affreux; le nez et presque tout son cartilage avoient disparu: outre cela il lui étoit survenu depuis un an, dans le dos, un ulcère de même nature, qui s'étoit accru au point qu'il occupoit un espace aussi grand que les deux mains, et qui répandoit comme celui du visage une humeur sanieuse, et en si grande quantité que quatre serviettes en étoient abreuvées chaque jour; l'odeur qui s'en exhaloit étoit si puante que personne ne pouvoit supporter l'approche du malade. M^r Cortela traita de la même manière que la fille dont je viens de parler, et le guérit parfaitement à peu près dans le même espace de temps. Les deux observations ont été insérées dernièrement dans la gazette de médecine.

Depuis environ 15 jours je donne moi-même ces remèdes à deux personnes du sexe; l'une âgée de 65 à 67 ans a été sujette depuis sa jeunesse aux humeurs froides; elle a actuellement des glandes extrêmement dures au tour du col; elle a une tumeur énorme au dessous de la hanche gauche, et qui s'étend intérieurement du côté de l'articulation de la cuisse; en préparant

avec les doigts cette tumeur, qui est insensible, on sent comme un fluide épais qui se perd sous les muscles fessiers, et qui revient lorsqu'on cesse de la presser: outre cela il y a encore une autre tumeur plus dure, grosse comme un œuf de poule, et un peu douloureuse à côté de la marge de l'anus; la malade sentoit aussi des douleurs très vives dans le genou gauche et dans d'autres parties du corps et elle est d'une maigreur extrême. L'autre personne est âgée de 29 ans; elle a depuis cinq ou six ans un paquet de glandes l'irrégulier au col et une autre glande tuméfiée et dure sous l'aisselle. ces deux malades avoient fait usage sans succès d'une infinité de remèdes; mais depuis le peu de temps qu'elles prennent de l'extrait de liège et de la pâte de roton, les accidents commencent à diminuer sensiblement; la première malade surtout ne sent plus ces vives douleurs qui la tourmentoient; la tumeur de la hanche est beaucoup moins grosse et plus circonscrite; et ce qui semble promettre un bon effet de ces remèdes dans cette malade, c'est que depuis qu'elle en fait usage, elle a un appétit qu'elle ne se souvient pas d'avoir jamais éprouvé; je rendrai compte à l'académie de ces cures et de quelques autres, si elles réussissent.

On doit juger, par tout ce que je viens de dire, combien nous devons nous intéresser à tout ce qui a



rapport à l'usage de la ligue; surtout lorsqu'il est
suivi de quelque suée; car le public attendra
toujours, pour établir sa confiance, que l'academie
apprecie elle même un remède qui paroît agir
en spécifique dans les maladies chirurgicales
les plus rebelles: les deux faits que M^r. Treccourt
luy a envoyés pourront contribuer à établir le
jugement qu'elle doit en porter.

je suis chargé de rendre compte de deux autres
observations du même auteur sur des amputations
peu usitées; c'est le titre que M^r. Treccourt leur
donne. La premiere est l'histoire de la maladie
d'un nommé M^r. Thomas avocat. il y avoit environ
un an que le malade, dont il falloit dire l'age,
ayant marché quelques lieues, ^{luy survint} il se forma une
ampoule sous le pied; on la coupa, et on y
appliqua des remèdes corrosifs: bientôt après il
se forma un ulcère fistuleux; les os du tarse, du
metatars, et les extrémités du tibia et du péroné
se carièrent; en un mot lorsque M^r. Treccourt vit
~~pour~~ la maladie pour la première fois, il n'y avoit
point de tems à perdre à faire l'amputation. ~~fin~~
ce praticien commença donc par proposer cette

opération; le medecin de la mai son la rejette, vu l'extrême foiblesse du malade: celuy ci y consentit; mais à cette condition qu'on ne luy couperoit la jambe qu'au dessus des malleoles où se borroit le mal. M^r. Brecourt combatit tant qu'il put cette opinion, parceque c'est une règle établie de préférer à couper la jambe, dans une pareille circonstance, trois ou quatre travers de doigts au dessus du genoux. mais le précepte n'est fondé que sur une raison frivole; qui est qu'en suivant cette méthode, on a plus de facilité d'adapter ~~au dessus~~ une jambe de bois pour retablir la progression; et que le peu de longueur du moignon qui reste de la jambe coupée, n'est ni desagréable ni embarrassante. Mais en supposant ^{même} qu'en coupant la jambe au dessus des malleoles, le génie et l'industrie ne puissent pas parer les inconveniens, dont je viens de parler.) cette considération doit elle estre mise en parattelle avec le danger plus grand qui accompagne, au qui suit l'opération lorsqu'on fait la section au dessus du genoux? Car il est certain, toutes choses égales d'ailleurs, qu'en coupant la jambe au dessus des malleoles, vu le plus grand



Eloignement qu'il y a de cet endroit au cœur, vu
 le peu d'épaisseur et la nature des parties coupées;
 il est certain, dis-je, que dans cette opération les
 accidens sont moins graves et la guérison plus
 prompte ^{et plus assurée} que dans l'autre: par conséquent est-il
 raisonnable de hazarder la vie du malade dans
 la vue seule de luy procurer plus de facilité et
 plus de grace en marchant. mais je dis plus,
 cette dernière raison est encore nulle depuis
 que M^r Ravaton a imaginé une espèce de
 botine, qu'on adapte à l'extrémité de la jambe
 conservée, et qui donne la facilité de marcher
 presque comme dans l'état naturel; c'est à
 dire en conservant les mouvements du genou,
 M^r Freecourt en a fait faire une pareille, à
 peu de chose près, pour M^r Thomas avec la
 laquelle il marche très commodément quoiqu'il
 soit grand et puissant. je conclus donc que
 M^r Freecourt a très bien fait de céder à l'instinct
 pour ainsi dire de son malade qui veilloit à sa conservation,
 en luy inspirant de ne point permettre qu'on
 luy coupât la jambe au dessous du genou, et je
 conclus encore que l'Académie doit faire usage

usage de l'observation de ce chirurgien pour réformer une pratique vicieuse, quoiqu'établie depuis longtemps, qui doit causer la mort à plusieurs malades.

La seconde observation du même auteur sur les amputations n'est pas aussi intéressante que la précédente; mais elle ne mérite pas moins l'attention de l'Académie. il s'agit dans cette observation de l'amputation de la main dans son articulation avec l'avant bras. on sait que la même raison qui a suggéré le précepte que je viens de combattre, c'est à dire de couper la jambe au dessous du genou, quoique le mal soit borné vers les malléoles, ne subsiste point par rapport à l'avant bras; aussi on nous a toujours enseigné dans la théorie des amputations de conserver le moignon de cette partie aussi long qu'il est possible pour l'avantage que le malade peut en retirer: le point essentiel de l'observation de M^r. Freecourt ne consiste donc que dans la section de la main dans l'articulation, au lieu de la faire un peu au dessus en fiant les os de l'avant bras.



M^r. Grandor a lu il y a quelque temps un memoire où il a tenté de prouver qu'il seroit plus avantageux dans tous les cas d'amputer les membres dans les articulations que de scier les os : or comme cette doctrine attend un certain nombre d'expériences, qui en constatent l'utilité, l'observation de M^r. Brecourt peut servir à l'appuyer par rapport au poignet.

Enfin dans un autre article ce chirurgien rapporte trois observations sur les effets dangereux des repercutifs les plus forts, comme l'eau froide, et l'oxierat froid, appliqués sur des parties enflammées par une érysipelle. Ces observations sont fort bonnes en soi ; mais elles ne présentent point une doctrine nouvelle ni contestée. tous les auteurs conviennent unanimement que ces fortes de remèdes sont extrêmement pernicieux. Dans les cas dont M^r. Brecourt parle ; et si quelques chirurgiens de la campagne s'en servent trop familièrement, comme cet auteur le dit, c'est par une ignorance si grossière, que l'academie se compromettrait si

elle se chargeoit de la recevoir dans ses memoires;
 il suffit de renvoyer les praticiens de campagne
 aux premiers Elements de la chirurgie; c'est
 pourquoi je pense que nous ne pouvons faire
 aucun usage des dernieres observations de
 M^r Créeourt.

Ce 26 janvier 1762 *fabre*



